



## **Sèrie 2**

### **Criteris generals per a la correcció:**

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat. Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre expressions equivalents. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. Penalització per errades de càlcul o transcripció:
  - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
  - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
  - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
  - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

**Qüestió 1**

**Resolució:**

a)

Com que  $f'(x) = 3x^2 - 12x$ , integrant tenim que  $f(x) = x^3 - 6x^2 + C$ , on  $C$  és una constant real.

Ara bé, sabem que  $f(x)$  talla l'eix d'abscises en  $x = 1$ , per tant,  $f(1) = 0$ . Substituïm:

$$f(1) = 1^3 - 6 \cdot 1^2 + C = 0 \rightarrow C = 5$$


I obtenim  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ .

b)

En el punt d'inflexió s'anul·larà la derivada segona:

$$f''(x) = 6x - 12 = 0 \rightarrow x = 2$$

Per estudiar la concavitat de  $f(x)$ , estudiarem el signe de la derivada segona:



A l'esquerra del punt  $x = 2$  la derivada segona és negativa i a la dreta del punt  $x = 2$  la derivada segona és positiva.

Per tant:


- En el punt  $(2, f(2))$  hi ha un punt d'inflexió.
- La funció té concavitat negativa o és còncava cap avall a l'interval  $(-\infty, 2)$
- La funció té concavitat positiva o és còncava cap amunt a l'interval  $(2, +\infty)$



Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

c)

La funció  $f''(x) = 6x - 12$  talla l'eix d'abscises en  $x = 2$  i l'enunciat ens diu que  $a > 2$ , fets que s'hauran de tenir en compte en el càlcul de les integrals definides:



$$15 = \int_0^2 (12 - 6x)dx + \int_2^a (6x - 12)dx$$

$$15 = [12x - 3x^2]_0^2 + [3x^2 - 12x]_2^a$$

$$15 = 24 - 12 + 3a^2 - 12a - 12 + 24$$

$$3a^2 - 12a + 9 = 0 \rightarrow a^2 - 4a + 3 = 0$$

Resolem l'equació de segon grau:

$$a = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2} = 2 \pm 1 \rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ a = 1 \end{cases}$$

Com que  $a > 2$ , només hi ha una solució:  $a = 3$ .

**Observació:** el plantejament de l'àrea també es pot fer a partir de la suma de les àrees dels dos triangles de la figura i no fent esment de cap càlcul integral.



**Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació**

---

**Pautes de correcció:**

- a) 0,25 pel plantejament que indica com obtenir la funció.  
0,25 pel càlcul de la integral.  
0,25 pel valor de la constant d'integració.
- b) 0,25 per calcular la derivada segona.  
0,25 pel punt d'inflexió.  
0,25 per l'estudi de la concavitat.
- c) 0,25 pel plantejament.  
0,25 pel càlcul de les primitives.  
0,25 per aplicar correctament la regla de Barrow.  
0,25 per trobar el valor del paràmetre.

(En el cas que aquest apartat s'hagi fet sense càlcul integral es repartirà el punt entre els passos que condueixin a la solució final.)



**Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació**

**Qüestió 2**

**Resolució:**

a)

La matriu de coeficients i la matriu ampliada,  $A$  i  $A'$ , són les següents:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a & 2 & 3 & 2 \\ 2 & a & 1 & a \\ \hline 1 & 1 & 4 & 1 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{A'}$

En primer lloc, es calcula  $\det(A)$

$$\begin{vmatrix} a & 2 & 3 \\ 2 & a & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4a^2 + 6 + 2 - 3a - a - 16 = 4a^2 - 4a - 8$$

que s'anul·la per als valors de  $a = -1$  i  $a = 2$ .

A continuació s'estudien els tres casos:  $a = -1$ ,  $a = 2$  i  $a \neq -1, 2$ .

**CAS  $a = -1$**

S'obté el sistema:

$$\begin{cases} -x + 2y + 3z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \\ x + y + 4z = 1 \end{cases}$$

On s'observa que sumant la primera més la segona equació s'obté la tercera per tant, el  $\text{rang}(A)$  i el  $\text{rang}(A')$  no seran màxims:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ \hline 1 & 1 & 4 & 1 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{A'}$

Com que sabem que  $\det(A) = 0$  i tenim que el menor  $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$ , aleshores el  $\text{rang}(A) = 2$ .

Com que de la suma de la primera més la segona equació s'obté la tercera, tots els menors d'ordre 3 seran nuls, i per al menor d'ordre dos no nul anterior,  $\text{rang}(A') = 2$ .



**Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació**

També es pot argumentar que el  $\text{rang}(A') < 3$  a partir de trobar que els determinants d'ordre corresponent són nuls.

Per tant, es té que  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 2 < 3 =$  nombre d'incògnites.

Per tant és un sistema compatible indeterminat (SCI) amb  $3 - 2 = 1$  grau de llibertat.

**CAS**  $a = 2$

En aquest cas, s'obté el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 2y + z = 2 \\ x + y + 4z = 1 \end{cases}$$

I en notació matricial s'obté

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 4 & 1 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{A'}$

On s'observa que la primera i la segona columna, dels coeficients de les  $x$  i les  $y$ , i el vector dels termes independents són iguals. Això ja ens diu que el rang de la matriu ampliada serà el mateix que el de la matriu de coeficients.

Per  $a = 2$  sabem que el  $\det(A) = 0$ , i com que  $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ , el  $\text{rang}(A) = 2$ .

Respecte a la matriu ampliada s'observa que no es podrà trobar cap determinant d'ordre 3 no nul ja que el vector de termes independents coincideix amb la primera i segona columna de la matriu  $A$ . I, per tant, es té que  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 2 < 3 =$  nombre d'incògnites. Per tant, és un sistema compatible indeterminat (SCI) amb  $3 - 2 = 1$  grau de llibertat.

**CAS**  $a \neq -1$  i  $a \neq 2$

Sabem que  $\det(A) \neq 0$ , per tant,  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 3 =$  nombre d'incògnites i és un sistema compatible determinat (SCD).



**Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació**

---

b)

Per a  $a = 2$ , s'ha de resoldre el sistema que ja sabem que serà SCI:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 2y + z = 2 \\ x + y + 4z = 1 \end{cases}$$

Fem la diferència de les dues primeres equacions i obtenim que  $z = 0$ .

Substituïm  $z = 0$  i ens queda el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ 2x + 2y = 2 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

On s'observa que les tres equacions són equivalents i, per tant, es confirma que és un sistema compatible indeterminat.

Si prenem  $y = \lambda$ , obtenim que les solucions del sistema són de la forma:  $\boxed{(1 - \lambda, \lambda, 0)}$ .

**Pautes de correcció:**

- a) 0,25 punts per la presentació matricial del sistema.  
0,5 punts per arribar als valors crítics per a la discussió.  
0,75 punts per la discussió dels tres casos (0,25 punts per cada cas).
- b) 0,25 punts per observar que és un sistema compatible indeterminat.  
0,75 punts per la solució.



Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

**Qüestió 3**

**Resolució:**

a)

Comprovem si la recta  $r$  es troba continguda en el pla substituint el punt

$P(2, -1, 3) \in r$  en l'equació del pla  $\pi: 2 - 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 - 4 = 12 \neq 0$ ; llavors no està continguda al pla.

Comprovem si la recta és paral·lela al pla. El producte escalar del vector normal al pla i el vector director de la recta hauria de ser nul ja que serien perpendiculars:

$(1, 3, 1) \cdot (1, -2, 4) = 1 - 6 + 4 \neq 0$ ; llavors no són paral·lels.

Així doncs, la recta  $r$  és secant al pla  $\pi$ .

El punt de tall entre la recta i el pla es pot calcular substituint  $x, y$  i  $z$  de la recta dins l'equació del pla:

$$(2 + \lambda) - 2(-1 + 3\lambda) + 4(3 + \lambda) - 4 = 0$$

$$2 + \lambda + 2 - 6\lambda + 12 + 4\lambda - 4 = 0 \rightarrow -\lambda + 12 = 0 \rightarrow \lambda = 12$$

El punt de tall és:  $(2 + 12, -1 + 3 \cdot 12, 3 + 12) =$  $(14, 35, 15)$ .

**Observació:** També es pot plantejar directament el sistema format per la recta i el pla per trobar la intersecció, estudiar-lo i resoldre'l.

b)

L'equació de la recta  $s$  perpendicular al pla  $\pi$  i que talli la recta  $r$  en el punt  $P$  té per vector director el vector normal al pla:  $\vec{v} = (1, -2, 4)$ .

El punt  $P$  ha de satisfer que:

$$2 + \lambda = 5 \cdot (-1 + 3\lambda) \rightarrow 2 + \lambda = -5 + 15\lambda \rightarrow 7 = 14\lambda \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

Llavors el punt  $P$  és  $(2 + 1/2, -1 + 3/2, 3 + 1/2) = (5/2, 1/2, 7/2)$  i la recta és:

$$\boxed{(x, y, z) = (5/2, 1/2, 7/2) + \mu(1, -2, 4)}$$

S'accepta l'equació de la recta en qualsevol format que també sigui correcte.





**Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació**

---

**Pautes de correcció:**

- a) 0,75 punts per la posició relativa de la recta i el pla.  
0,5 punts per calcular el punt de tall de la recta i el pla.
  
- b) 0,25 punts per identificar el vector director de la recta  $s$ .  
0,25 punts per formular el càlcul del punt.  
0,25 punts per trobar el punt  $P$ .  
0,5 punts per l'equació de la recta.



#### Qüestió 4

##### Resolució:

a)

De la funció  $g$  tenim la informació següent:  $g(0) = 5$ ,  $g'(1) = 0$ ,  $g''(x) = 2x + 1$ .

Per tant, sabem que  $g'(x) = x^2 + x + m$  on  $m$  és una constant real. Com que  $g'(1) = 0$  deduïm que  $m = -2$ . Aleshores  $g(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + n$  on  $n$  és una constant real. Com que  $g(0) = 5$  deduïm que  $n = 5$ . Així tenim que

$$g(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 5$$

**Observació:** També és totalment correcte el plantejament inicial de

$g(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$  i imposant les condicions obtenir els valors respectius de  $a$ ,  $b$ ,  $c$  i  $d$ .

b)

La funció  $f$  és polinòmica i, per tant, contínua i derivable a tots els nombres reals.

Comprovem fàcilment que  $f(2) = 0$  i per tant  $x = 2$  és una arrel de la funció.

Per comprovar si és estrictament creixent a l'interval indicat calculem la funció derivada  $f'(x) = -3x^2 + 12x$ , que s'anul·la per a  $x = 0$  i  $x = 4$ .

Com que es tracta d'una paràbola amb coeficient principal negatiu deduïm que la derivada és estrictament positiva en l'interval  $(0,4)$  i, per tant, que la funció  $f$  és estrictament creixent en aquest interval. Això implica que la funció  $f$  no té més arrels en aquest interval i per tant l'àrea  $A$  demanada es pot calcular amb l'expressió següent:

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_0^2 (-x^3 + 6x^2 - 16) dx \right| + \left| \int_2^4 (-x^3 + 6x^2 - 16) dx \right| = \\ &= \left| \left( \frac{-x^4}{4} + 2x^3 - 16x \right) \Big|_0^2 \right| + \left| \left( \frac{-x^4}{4} + 2x^3 - 16x \right) \Big|_2^4 \right| = 20 + 20 = 40 \text{ u}^2. \end{aligned}$$



**Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació**

---

**Pautes de correcció:**

- a) 0,25 punts pel plantejament.  
0,25 punts per trobar la derivada primera.  
0,25 punts per determinar la constant d'integració  $m$ .  
0,25 punts per determinar la constant d'integració  $n$ .
  
- b) 0,25 punts per comprovar que la funció té una arrel en  $x = 2$ .  
0,25 punts per calcular la derivada primera.  
0,25 punts per justificar el creixement estricte de la funció en l'interval donat.  
0,25 punts per escriure les dues integrals definides correctament.  
0,25 punts per calcular la primitiva.  
0,25 punts per la regla de Barrow i resultat de l'àrea.



**Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació**

**Qüestió 5**

**Resolució:**

**a)**

Calculem l'expressió de  $X^2$  en funció dels paràmetres i la iguaem a la matriu donada:

$$X^2 = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & a+b & 1 \\ 0 & b^2 & b+c \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

D'aquesta igualtat de matrius en sorgeixen les equacions següents:

$$a^2 = 1 \rightarrow a = \pm 1$$

$$b^2 = 1 \rightarrow b = \pm 1$$

$$c^2 = 1 \rightarrow c = \pm 1$$

$$a + b = 0 \rightarrow a = -b$$

$$b + c = 0 \rightarrow b = -c$$

Lavors, les solucions per  $a, b$  i  $c$  són:

$$a = 1, b = -1, c = 1 \quad \text{i} \quad a = -1, b = 1, c = -1$$

És a dir, hi ha dues possibles matrius  $X$ :

$$\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \quad \text{i} \quad \boxed{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}$$

**b)**

Només cal imposar que

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplicant obtenim la següent igual matricial.

$$\begin{pmatrix} \frac{a}{2} & 1 - \frac{a}{2} & 1 - \frac{a}{2} \\ 0 & b & b - 1 \\ 0 & 0 & -c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



**Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació**

I igualant terme a terme els elements de la diagonal obtenim

$$\frac{a}{2} = 1 \rightarrow a = 2; \quad b = 1; \quad -c = 1 \rightarrow c = -1.$$

I també es compleix que  $1 - \frac{a}{2} = 0$  per al valor  $a = 2$ , i  $b - 1 = 0$  per al valor  $b = 1$ .

Així la solució és  $\boxed{a = 2, b = 1 \text{ i } c = -1}$ .

**Observació:** De forma alternativa també es pot calcular la matriu inversa  $X^{-1}$  i igualar-la a la matriu que ens dona l'enunciat.

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{abc} \begin{pmatrix} bc & 0 & 0 \\ -c & ac & 0 \\ 1 & -a & ab \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Igualant els elements de la diagonal de les dues matrius, tenim que:

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{2} \rightarrow a = 2; \quad \frac{1}{b} = 1 \rightarrow b = 1; \quad \frac{1}{c} = -1 \rightarrow c = -1$$

I també són certes les igualtats de la resta de termes de fora de la diagonal.

Així la solució és  $\boxed{a = 2, b = 1 \text{ i } c = -1}$ .

**Pautes de correcció:**

- a) 0,25 punts per calcular  $X^2$ .  
0,25 punts per plantejar el sistema d'equacions que cal resoldre.  
1 punt per donar les dues solucions dels tres paràmetres (0,5 per a cada solució).
  
- b) 0,25 punts per plantejar el producte igual a la identitat.  
0,25 punts pel producte matricial.  
0,25 per plantejar el sistema d'equacions que cal resoldre.  
0,25 punts per trobar els valors dels tres paràmetres.



### Qüestió 6

#### Resolució:

a)

L'àrea del trapezi és  $A = \frac{3x}{2} \cdot h$  i utilitzant que l'àrea fa  $30 \text{ m}^2$  obtenim  $h = \frac{20}{x}$ . Observem que podem descomposar el trapezi en un rectangle de base  $x$  i altura  $h$  i un triangle rectangle d'hipotenusa  $D$  i catets  $x$  i  $h$ . Ara només cal aplicar el teorema de Pitàgores a aquest triangle per obtenir  $D(x) = \sqrt{\frac{400}{x^2} + x^2}$ .

b)

Per minimitzar la funció  $D(x)$  derivem obtenint

$$D'(x) = \frac{\frac{-800}{x^3} + 2x}{2 \cdot \sqrt{\frac{400}{x^2} + x^2}} = \frac{\frac{-400}{x^3} + x}{\sqrt{\frac{400}{x^2} + x^2}}$$

Resolem ara l'equació  $D'(x) = 0$  o equivalentment  $\frac{-400}{x^3} + x = 0$  i obtenim  $x^4 = 400$  i, tenint en compte que només podem prendre les solucions positives, l'únic candidat a extrem és  $x = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ . Ara podem observar que en l'interval  $(0, 2\sqrt{5})$  tenim  $D'(x) < 0$  i, per tant,  $D$  és decreixent i que a l'interval  $(2\sqrt{5}, +\infty)$  tenim  $D'(x) > 0$  i, per tant,  $D$  és creixent, i, per tant, en  $x = 2\sqrt{5}$  hi ha un mínim.

Així les dimensions que fan el costat oblic mínim són

$$x = h = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ m} \quad \text{i} \quad D = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \text{ m}.$$

**Observació:** Per al càlcul del punt singular, també es pot procedir a derivar la funció  $D^2(x) = \frac{400}{x^2} + x^2$ , sempre que s'argumenti que tindrà localitzats els extrems en els mateixos valors de les abscisses.



**Pautes de correcció:**

- a) 0,25 punts per justificar la relació entre l'altura i la base superior del trapezi.  
0,25 punts pel plantejament per trobar la segona relació.  
0,25 punts per aplicar correctament el teorema de Pitàgores.  
0,25 punts per justificar la relació entre el costat  $D$  i la base superior del trapezi.
  
- b) 0,5 punts per la derivada de  $D(x)$ .  
0,25 punts per trobar el punt crític.  
0,25 punts per justificar que el punt crític correspon a un mínim.  
0,5 punts per donar els valors de  $h, x$  i  $D$ .